



綜合感冒劑

YCC-007
衛署藥製字第029226號

理冒

永克風

膠囊

Fucole

COLD

Capsules

【成分】

有效成分及含量：每膠囊中含：Paracetamol.....300mg
dl-Methylephedrine Hydrochloride.....10mg
Chlorpheniramine Maleate.....2.1mg
Caffeine Anhydrous.....30mg
Thiamine Mononitrate.....4.5mg
Riboflavin.....4mg
Ascorbic Acid.....21mg

其他成分（賦形劑）：Silicon Dioxide Colloidal、Lactose、Talc、Sodium Citrate、Magnesium Stearate、Capsule #0 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF、Allura Red AC)。

【作用】

- 1. 本藥係以解熱鎮痛成分Acetaminophen為主劑，其可經由中樞的阻斷作用，產生鎮痛效能而同時發揮解熱鎮痛的雙重功效。
- 2. 本藥配合支氣管擴張成分dl-Methylephedrine Hydrochloride，對感冒引發之咳嗽及支氣管痙攣具有緩解的效果。
- 3. 本藥添加抗過敏成分Chlorpheniramine Maleate，可控制流鼻水、打噴嚏及喉頭不適感。

【用途（適應症）】

緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛）。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用
 - 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治
 - 1. 12歲以下。
 - 2. 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 - 3. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病（如慢性氣管炎或肺氣腫）所引起之持續或慢性咳嗽的人。
 - 4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 - 5. 有心臟病及65歲以上的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
 - 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - 2. 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
 - 3. 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
 - 4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項
 - 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - 2. 避免陽光直射。
 - 3. 勿超過建議使用量。
 - 4. 不要服用本藥超過七日。
 - 5. 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
 - 6. 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
 - 7. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 - 8. 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

通常成人每次1粒，1天3次，飯後服用。

【警語】

一、使用本藥後，若發生下列副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振、口乾。
神經系統	頭暈、耳鳴、錯亂、不安、躁動、神經質。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 有任何不適情況產生。
2. 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
3. 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
4. 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
5. 服用過量【每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)】，或服藥後出現下列症狀：
胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
6. 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】

6~1000粒玻璃瓶裝、塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【給感冒患者的建議】

1. 多休息、多調養及注意營養補給以提高身體對疾病的防禦力。
2. 保持溫暖、增加室內溫度將有助於緩解部份症狀。
3. 多飲水以補充因感冒症狀所引起之水份流失。
4. 避免到公共場所或擁擠的地方，以免接觸更多病菌而加重病情。
5. 適當的服用感冒藥雖能提供症狀的部份舒解，但若症狀仍然持續2-3天以上，就必須找醫師診斷是否患有其他併發性疾病。



永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2145405