



制酸劑

SWS-007
衛署藥製字第028516號

適胃康[®]

Swecon[®]

懸液100毫克/毫升

Suspension 100mg/mL

胃內含有一種專門消化蛋白質的酵素，稱之為胃蛋白酶(Pepsin)。當胃內胃酸增多時可提升其消化蛋白質的能力，如果胃酸經常性過多，此酵素的消化力也會有過旺的現象，結果連胃、十二指腸壁本身的肌肉也被消化、侵蝕而形成潰瘍。

【作用】

本藥含Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate (Hydrotalcite)，其成分原料為微細粉末，能在各種強度的胃液中與胃酸充分作用，而使胃液的pH保持於3~5之最適值，因此適胃康懸液能中和胃酸，緩解胃酸過多引起之不適。

【成分】

有效成分及含量：每mL中含

Magnesium Aluminum Hydroxide Carbonate Hydrate (Hydrotalcite).....100mg
單次劑量(10mL)之酸中和能力大於24.0mEq，鎂含量小於23.0mEq。

其他成分(賦形劑)：Sodium Saccharin、Peppermint Oil、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Sodium Carboxymethylcellulose、Glycerine、Alcohol、Purified Water。

【用途(適應症)】

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 3歲以下。
 2. 消化道潰瘍的人。
 3. 有腎臟疾病的人。
 4. 腎衰竭病患(長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症、透析性腦病變及低磷血症，應謹慎小心使用。)
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 2. 與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
 5. 使用前須振搖均勻，並使用包裝內附量器(本包裝內附30mL量杯)量取藥量。

【用法用量】

一天3至4次，或需要時服用。

年齡	使用量
12歲以上	每次10mL (1包)
6歲以上未滿12歲	每次5mL (1/2包)
3歲以上未滿6歲	每次2.5mL (1/4包)
3歲以下	請洽醫師診治

【警語】

一、使用本藥後，若發生下列副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
胃腸道	便秘、噁心、嘔吐、腹瀉

二、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】

60~4,000毫升塑膠瓶裝、6~400包鋁箔袋裝(每包10毫升)。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【給消化系統異常患者的治療建議】

1. 少吃刺激性食物或飲料，如辛辣製品、酒精、咖啡、茶等。
2. 調整正常生活作息，減少過多的精神壓力。
3. 多攝取蔬菜與水果，補充足夠的纖維量以避免消化不良及便秘情形。
4. 避免不必要的藥物投與，如消炎鎮痛劑，以減少其對消化道的破壞。
5. 遵從醫師藥師藥劑生指示，按時正確服藥。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2145162