



# 喉福<sup>®</sup> Horf<sup>®</sup>

GFT-010  
衛署藥製字第030416號

喉錠

Lozenges

3.98cm

本藥含Chlorhexidine Hydrochloride與Benzocaine，對革蘭氏陽性、陰性菌以及念珠菌屬(monilia)、麴菌屬(aspergillus)均有其抑菌至殺菌作用；對於口腔與咽喉部感染區的疼痛亦有表面麻醉作用，並可緩解炎症性刺激所引起之咽喉不適、咽喉癢感，但不影響患者之吞嚥動作或妨礙傷口之癒合；為對口內炎、咽喉炎、齒齦炎等口腔與咽喉部感染時之綜合殺菌止痛劑。

**【成分】** 每錠中含：

Chlorhexidine Hydrochloride.....5mg  
Benzocaine.....2mg

**【賦形劑】**

Menthol、Sugar、Ammonium Monoglycyrhizinate、Magnesium Stearate、Talc、Spearmint、Peppermint Oil、Carboxymethylcellulose Sodium、Mannitol、Sodium Saccharin、Lactose。

**【特徵】**

1. 本藥對於革蘭氏陽性、陰性菌均具有抑菌至殺菌能力，同時對於念珠菌屬(monilia)、麴菌屬(aspergillus)亦有療效，本藥可適用於口內炎、口內瘡、咽炎、喉炎、扁桃腺炎、齒齦炎、齒槽膿漏、智齒周圍炎等牙科、耳鼻喉科等。
2. 本藥中含表面麻醉劑，舉凡口腔、咽喉部感染之疼痛感均可緩解之，另外由於炎症性刺激所引起之咽喉部不適，癢感亦可而並不影響患者之吞嚥動作，味覺或妨礙傷口之癒合。
3. 本藥對口腔、咽喉等局部組織無刺激性或損害。
4. 本藥作用直接而確實，為牙科、耳鼻喉科領域中甚有價值的輔助療法劑，尤以兒童最適用之。
5. 本藥對於鏈球菌、葡萄球菌具強力的抗菌作用，依照建議劑量按時使用，可使患者口腔內細菌數量減低。
6. 於扁桃腺切除術後以及牙齒拔除術後之患者以預防口腔及咽喉部之繼發性細菌感染症。

**【適應症】**

口內炎、咽喉炎、牙齒拔除術後細菌性繼發感染症之預防。

**【用法用量】**

每天4~5次，每次一錠。  
含於口腔內讓其緩慢溶解。  
醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

1. 本藥品含Benzocaine成分，可能造成罕見但嚴重的變性血紅素血症(methemoglobinemia)之不良反應。若在用藥後（通常於2小時內）發生虛弱、精神混亂、頭痛、呼吸困難，或皮膚顏色呈現蒼白灰色或藍色，可能是變性血紅素血症之症狀，請立刻停止用藥，並且諮詢醫師。
2. 本藥品勿大量或大體表面積使用，儘可能以可達預期療效之最少劑量使用。
3. 對Benzocaine成分藥品過敏之病人請勿使用。
4. 本藥品應小心謹慎用於兒童。
5. 民眾在貯放該類藥品時，應放置於兒童無法觸及處，以免誤用藥品。
6. 除非在醫療專業人員的建議及監督下，該類藥品勿使用於2歲以下之嬰幼兒，成人亦應遵循仿單（藥品說明書）相關內容使用。倘若於用藥期間有任何不適或疑問，應立即就醫。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

**【包裝】**

8~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2140993