

減少因黴菌感染所引起之頭皮屑治療之輔助劑。

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 曾因本藥成分引起過敏。
2. 12歲以下。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

有深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
2. 正在使用腎上腺皮質類固醇或其他藥品的人。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
4. 意外吞食時，請立即就醫。請勿催吐或洗胃。
5. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
6. 長期使用腎上腺類固醇治療的患者。為避免突然停藥造成反彈作用，建議漸減停藥。

時間 (開始使用科多)	類固醇用量
第一週	不變
第二週以後	逐漸減少藥量至停藥

7. 勿超過建議使用量或使用次數。
8. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
9. 一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。



永信製藥集團結合了國內最大股票上市生技製藥跨國公司
(永信藥品)之品質控管與全方位之健康服務平台，
滿足關心健康的您，最安心與便利的需求。

 國家醫藥品質獎

衛署藥製字第041741號



KTL-007

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100
台中幼獅廟：台中市大甲區日南里工九路27號

ZuDo
科多

Shampoo 2%
洗髮精 2%

增刊 增刊 增刊

(有效止頭皮癢、去頭皮屑)

頭皮屑又稱為“乾性脂漏”，歸屬為脂漏性皮膚炎之一種，其不但會影響觀瞻，又會引起頭皮的劇癢，著實令人難受。

其大都是因為頭皮細胞剝落過於頻繁所致，歸納其誘因不外乎為微生物因素—皮膚芽孢菌(*Pityrosporum ovale*)、頭皮或其他器官功能失調、營養失調、生活起居不正常、情緒緊張或化學藥劑(洗髮精、燙髮液)過度使用後的結果。

無論如何，皮屑芽孢菌，此種酵母樣真菌好發於頭皮及其他脂漏部位，如鼻子、眼瞼、鼻唇溝及胸部等，故於頭皮屑及脂漏性皮膚炎之發病誘因中，扮演著極重要的角色。

針對治療頭皮癢、頭皮屑之“科多洗髮精”，因含特殊配方之Ketoconazole成分，能深入皮下組織，干擾病原菌—皮癬菌及酵母菌細胞膜之合成，而達到最佳之治療效果。

科多洗髮精除了可治療頭皮部分的脂漏性皮膚炎、頭皮屑之外，亦能有效防止汗斑的形成。

1. 本品內含珍貴抗黴成分Ketoconazole，可有效抑制黴菌細胞膜重要組成——麥角固醇(Ergosterol)的合成，而阻斷致病黴菌的生長與繁殖，又針對形成頭皮屑的真正誘因——皮屑芽孢菌，本品特具顯著的控制效果。
2. 本品不但具有迅速去頭皮屑、止頭皮癢的功效之外，亦同時對皮黴菌或酵母菌引起的其他黴菌感染症，如花斑癬（俗稱汗斑）具有防治的效能。
3. 本品配方溫和，使用後不傷髮質。

有效成分及含量：每公克中含：
Ketoconazole.....20 mg
 其他成分（賦形劑）：
 Hydrochloric Acid、Ammonium Lauryl Sulfate、Laureth Sulfosuccinate Disodium、Cocamidopropyl Amino Betaine、Isostearamidopropyl-M.L、Mackernium、Kathon CG/ICP、Bouquet、Fruilix、Sodium Hydroxide、Allura Red AC、dl- α -Tocopherol、Purified Water。

1週2次	2次間隔至少3天，使用時間不超過4週。
------	---------------------

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：
綜合二十二項、共2890個受試者評估Ketoconazole 2%洗髮精安全性的臨床試驗顯示，並無最常見的副作用(≥1%)，而常見的副作用(<1%)包括：

相關部位	症狀
眼睛	眼睛刺激敏感、淚水增多
使用部位	紅斑、刺激敏感、過敏、搔癢、局部反應
皮膚或皮下組織	面皰、禿頭、接觸性皮炎、皮膚乾燥、皮膚灼熱感、皮膚不適、脫皮、髮質變化、膿皰、紅疹、毛囊炎 罕見*：血管性水腫、蕁麻疹、髮色改變
免疫系統	過敏症
其他	味覺改變

*根據產品上市後安全監測的結果顯示，僅有十分罕見的副作用發生

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
1. 若有上述外之其他不適情況產生。
 2. 自覺狀況沒有改善或更惡化。
 3. 一般菌苗治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

10公撮/鋁箔袋，400包以下盒裝、4000公撮以下瓶裝。

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。



1. 治療前先確定頭皮屑之病因
(感染或化學刺激引起)。
2. 規律的生活。
3. 均衡之飲食，避免食用過多油炸類、
罐頭類或速食餐類食品。
4. 保持頭髮之清潔，但不可過度的清洗。
5. 整髮用具應於每次使用後，立即清洗。
6. 每次洗髮時，應將殘留於頭皮上之化
學品徹底洗淨。
7. 儘量使用洗淨成分較少(低鹼性)，且
潤絲含量較多之中性溫和洗髮精。
8. 避免緊張及焦慮。
9. 選擇合適的“藥用”洗髮精。

